患者指导

MoviPrep® 药盒内装有 4 小袋药物和一个供混合用的一次性容器。
您必须完成全部准备工作，以确保最有效地清洁肠道。

第一剂的开始时间为 5 P.M. **第二剂的开始时间为** A.M. *

*start 5 hours before procedure

第 1 步：*混合药剂*

- 将 1 个 A 袋和 1 个 B 袋完全倒入一次性容器
- 加入微温水，直到容器最上方的刻度线，然后混匀

注意：您可以提前混匀溶液并冷藏。
配好的溶液应在 24 小时内服用。

第 2 步：*饮用药物*

- MoviPrep 容器上标有 4 个刻度。每 15 分钟饮用溶液至下一个刻度（大约 8 盎司），直到喝完一升溶液

第 3 步：*饮用清澈液体* 盎司

- **饮用 16 盎司您自行选择的清澈液体。**这有助于确保充分补液和有效清肠，是一个必需步骤

清澈液体包括：水、不含果肉的清澈果汁（包括苹果汁、白葡萄汁或白酸梅汁）、滤过后的酸橙汁或柠檬汁、咖啡或茶（请勿添加奶精或植脂末）、清澈肉汤、清澈苏打水、胶冻（不添加水果或装饰配料）和棒冰（不含水果块或果肉）。如果您不清楚某一饮品是否可以饮用，请咨询医生。

遵循步骤 1-3 服用第一剂。重复步骤 1-3 服用第二剂。

如果您有任何问题，请拨打我们的诊室电话 _____

结肠镜检查前的肠道准备可导致身体流失大量水分，并有可能因脱水而引发疾病。
在准备过程中饮用所有需要的清澈液体，保持身体水分。

重要安全信息（续）

如果您患有一种名叫葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏症的红细胞破坏性疾病，请在服用 MOVIPREP 之前告诉您的医生。

请知悉，MOVIPREP 的每一疗程药物中含有 131 毫克苯丙氨酸。

如果您正在怀孕或打算怀孕，请在服用 MOVIPREP 之前告诉您的医生。

据 MOVIPREP 的临床研究表明，分次服用方案的最常见副作用包括不适（感觉不舒服）、恶心、胃（腹部）痛、呕吐以及上腹痛。仅晚间服用方案的最常见副作用包括胃胀（腹胀）、肛部不适、口渴、恶心、胃（腹部）痛、睡眠障碍、寒颤（身体发抖）、饥饿、不适（感觉不舒服）、呕吐和头晕。

我们鼓励您将处方药的不良副作用上报给 FDA。敬请访问 www.fda.gov/medwatch/ 或致电 1-800-FDA-1088。

若需获取产品信息、不良事件报告和产品投诉报告，请联系：

Salix 产品信息客服中心：
电话：1-800-508-0024 | 传真：1-510-595-8183 | 电子邮件地址：salix@medcomsol.com

完整处方信息请见 MOVIPREP.com。

MoviPrep®
(PEG-3350, sodium sulfate, sodium chloride, potassium chloride, sodium ascorbate, and ascorbic acid for oral solution, 100 g/7.5 g/2.691 g/1.015 g/5.9 g/4.7 g)

Salix® Pharmaceuticals, Inc.

网址：MoviPrep.com 8510 Colonnade Center Drive, Raleigh, NC 27615 电话：866.669.SLXP (7597).
MoviPrep® 是一个注册商标，PM|AM Split Dosing™ 是 Salix Pharmaceuticals, Inc. 的商标。
© 2014 Salix Pharmaceuticals, Inc. 保留所有权利。美国印刷。MOV36-0414

SIMPLIFIED CHINESE