

SUPREP® 결장경 검사 준비 키트

(황산나트륨, 황산칼륨 및
황산마그네슘)
경구 복용 용액

6온스당 (17.5g/3.13g/1.6g)



SUPREP 결장경 검사 준비 키트는 여러 차례에 걸쳐 투여(2일)하는 약제입니다. 6온스 약병 두 개를 모두 복용해야 준비가 완료됩니다.

1차 복용: 시술 전 저녁 오후 5 시에 1단계를 시작하여 아래와 같이 복용합니다.

잠자리에 들기 전 6온스짜리 병 한 개(1)를 이용하여 1단계에서 4단계를 모두 마쳐야 합니다.

1단계



SUPREP 6온스짜리
병 한 개(1)를 혼합
용기에 붓습니다.

2단계



용기에 16온스
라인까지 차가운
식수를 넣고
섞습니다.


참고: 사용하기 전에
지침에 따라 원액을
희석시킵니다.

3단계



용기 안에 담긴
용액을 모두
마십니다.

4단계



앞으로 1시간 동안
16온스 용기에 담긴
물을 두 번(2) 더
마셔야 합니다.

2차 복용: 시술 전 아침 오전 5 시에 1단계를 시작하여 위와 같이 복용합니다.

이번 복용에서는 다른 6온스 병을 사용하여 위의 1단계부터 4단계를 반복하십시오.

참고: 결장경 검사를 시작하기 최소 2시간 전에 또는 별도의 지침에 따라 마지막 잔의 물을 마셔야 합니다.

(뒷면의 추가 지침을 참조하십시오.)