

SUPREP[®]

腸道準備配套

(硫酸鈉、硫酸鉀和硫酸鎂)
口服液

每 6 盎司 (17.5g/3.13g/1.6g)



SUPREP 腸道準備配套是一種分次劑量 (2 天) 的療程。為完成準備，必須服用兩瓶 6 盎司準備劑。

第一劑：在您接受檢查的前一天晚上 5 時開始，按照以下指示進行第一步：

您必須在睡前使用一 (1) 瓶 6 盎司準備劑完成第一步到第四步：

第一步



將一 (1) 瓶 6 盎司
SUPREP 準備劑溶液
倒入攪拌容器。

第二步



加入涼開水至達到容
器上 16 盎司的標線
處，然後均勻混合。

備註：使用前請依
照指示稀釋濃縮液。

第三步



喝下容器內的**所有**
液體。

第四步



在接下來 1 個小時
內，您**必須**喝下另外
兩 (2) 個 16 盎司容
器的水。

第二劑：在您接受檢查的當天早上 _____ 時開始，按照以上指示進行第一步：
* START 5 HOURS BEFORE PROCEDURE

服用這一劑準備劑時，請用另一瓶 6 盎司準備劑重複上述第一步到第四步。

備註：您**必須**在結腸鏡檢查至少 2 個小時以前或者依照指示喝完最後一杯水。

(請參閱另一頁的附加說明。)

SIMPLIFIED CHINESE